

# Perruche de Pennant

*Platycercus elegans*



## Ordre

Psittaciformes

## Famille

Psittacidés

**Genre :** *Platycercus*

## Anglais

Crimson Rosella

## Sous-espèces

*P. e. elegans*

*P. e. nigrescens*

*P. e. melanoptera*

## VIE ET MŒURS

### EN CAPTIVITÉ

- ☛ Oiseau très populaire en aviculture car il est très coloré
- ☛ Reproduit assez bien en volière de 4 m sur 0,80 m.
- ☛ La femelle pond 5 à 7 œufs qu'elle couve pendant 20 jours dans un nid de 30 x 30 x 55 sur un fond de tourbe bien humidifié.
- ☛ Les jeunes sont bagués en 6 mm.
- ☛ La mutation la plus cou-

rante est la bleue. Existe aussi en jaune, panachée, cinnamon.

### ÉTAT SAUVAGE

- ☛ Vit en couple ou petit groupe de 6 à 10 oiseaux. On la voit souvent sur le sol à la recherche de graminés. Sédentaire elle est peu farouche.
- ☛ La femelle a la tête plus petite que le mâle et le bec est moins large.


### Aire de répartition

Est et Sud-est de l'Australie, introduit en Nouvelle-Zélande et dans l'île de Norfolk.



# Perruche érythroptère

*Aprosmictus erythropterus*



## Ordre

Psittaciformes

## Famille

Psittacidés

## Genre

*Aprosmictus*

## Anglais

Red-ringed Parrot

## Sous-espèces

*A. e. erythropterus*

*A. e. coccineopterus*

## VIE ET MŒURS

### EN CAPTIVITÉ


- Élevage un peu délicat car les oiseaux doivent être au calme pendant la période de reproduction.
- Reproduit à partir de trois ans.
- La femelle pond 3 à 6 œufs qu'elle couve pendant 20 jours dans un nid d'environ 35 x 35 x 90 cm.
- Les jeunes sont bagués en 6,5 mm.

### ÉTAT SAUVAGE

- Vit dans les forêts d'eucalyptus en couple ou en petit groupe.
- Ne vient sur le sol que pour boire.
- La femelle a le dos vert et le plumage est moins lumineux que chez le mâle.
- Oiseau granivore qui aime aussi les fruits et les graines germées.

### Aire de répartition

Nord et nord-est de l'Australie et sud de la Nouvelle Guinée.



# Perruche mélanure

*Polytelis anthopeplus*



## Ordre

Psittaciformes

## Famille

Psittacidés

## Genre

*Polytelis*

## Anglais

Regent Parrot

## Sous-espèces

*P. a. anthopeplus*

*P. a. westralis*

## VIE ET MŒURS

### EN CAPTIVITÉ

- Beaucoup moins répandue en élevage que les autres espèces du même genre.
- Oiseau calme.
- La femelle pond 3 à 7 œufs qu'elle couve pendant 20 jours dans un nid d'environ 34 x 34 x 80 cm.
- Les jeunes sont bagués en 6,5 mm.

### ÉTAT SAUVAGE

- Vit souvent en couple ou petit groupe mais on peut parfois observer des volées de 300 oiseaux.
- Aime se nourrir sur le sol.
- La femelle a la tête et la poitrine jaune olive.
- Oiseau granivore.
- La sous-espèce *westralis* est plus petite et plus verte.


### Aire de répartition

Sud-ouest et intérieur du sud-est de l'Australie.



# Perruche calopsitte

Calopsitte élégante - *Nymphicus hollandicus*



## Ordre

Psittaciformes

## Famille

Psittacidés

## Genre

*Nymphicus*

## Anglais

Cockatiel

## Sous-espèce

Aucune

## VIE ET MŒURS

### EN CAPTIVITÉ

- Oiseau très populaire en aviculture car facile à élever et assez prolifique.
- Oiseau à conseiller aux débutants. S'apprivoise assez facilement.
- La femelle pond 5 à 6 œufs qu'elle couve pendant 19 jours.
- Les jeunes sont bagués en 5,5 mm.

• Il existe de très nombreuses mutations : panachée, perlée, cinnamon, lutino... et la même chose dans la série à face blanche.

### ÉTAT SAUVAGE

- Vit en petit groupe mais on peut voir des colonies très importantes pendant la période de migration. Oiseau nomade.
- La femelle possède très peu de jaune à la tête.

### Aire de répartition

Toute l'Australie sauf la Tasmanie.

